

前立腺：ジェブタナ／3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果
①	グラニセトロンバッグ 100mL	グラニセトロン デキサート ガスター ポララミン	吐き気止め アレルギー予防
②	生理食塩液 50 mL		
③	生理食塩液 250mL	ジェブタナ	抗がん剤
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す
合計	450mL	点滴時間	およそ 1 時間 45 分

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は3週間に1回行います。
(3週間で1クール)
- 症状によって変更することがあります。



副作用

副作用	起こりやすさ	副作用	起こりやすさ
脱毛	★	白血球減少	★★★★
吐き気・嘔吐	★★	血小板減少	★★
口内炎	★	下痢	★★
食欲不振	★★	しびれ・むくみ	★
体のだるさ	★★	発疹	★

※ 副作用の出かたには個人差があります。

注意点

- 点滴にはアルコールが含まれます。投与当日の自動車の運転などは控えましょう。
- ごく稀に心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、お知らせください。