

乳腺：エリブリン day1,8/3wks

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL	デキサート	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 30mL	エリブリン	抗がん剤	5分
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	130mL	点滴時間 およそ 35分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

今後の予定

- 点滴は1週間に1回、2週間続けたあと、1週休みます。
- 3週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

エリブリン | ■□□□□□□ | ■□□□□□□ | □□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★★		疲労	★★
数日から数週間	食欲不振	★★		手足のしびれ 指先の痛み	★★
	下痢・便秘	★		味覚障害	★
	脱毛	★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★		★ 30%未満	
	出血	★		★★ 30%~60%	
		★★★ 60%以上			

※ 副作用の出かたには個人差があります。
 投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少
 投与後 3 週間：血小板減少

注意点

- ごくまれに間質性肺炎が起こることがあります。
 (初期症状：息切れ、呼吸がしにくい、空咳、熱など)
 その場合はすぐにお知らせください。
- まれに肝機能障害が起こることがあります。
 (定期的に肝機能検査を行います)
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- パンフレットを参考に、感染予防を実施してください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。