

# 乳腺：カドサイラ/3weeks

## 点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 50mL	デキサート	吐き気止め	15分
②	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	15分
③	生理食塩液 250mL	カドサイラ	抗がん剤	90分 (→30分)
④	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	15分
合計	400mL	点滴時間 およそ2時間15分 (2回目以降 およそ1時間15分)		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

## 今後の予定

- 点滴は3週間に1回の予定です。
- 3週間をひとかたまりとして繰り返します。
- 症状によって変更することがあります。

カドサイラ | ■□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ |

## 主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★
	下痢	★		におい・味覚の変化	★
	便秘	★	起こりやすさの目安		
	脱毛	★	★ 30%未満		
	白血球減少	★	★★ 30%~60%		
	血小板減少	★★	★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。

## 注意点

- 初回の点滴後24時間(特に点滴後最初の2時間)は過敏症や悪寒などが起こることがあります。
- 血小板減少により、出血が起こりやすくなります。転倒や怪我に注意してください。
- 肝臓の機能が低下することがあります。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。(定期的に心機能検査を行います)
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。