

乳腺：ダトロウェイ/3wks

点滴

	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	(のみ薬)	カロナール錠 2錠	Infusion reaction 予防	
	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート ガスター ポララミン	吐き気止め アレルギー予防	30分
①	5%ブドウ糖液 100mL		ルートを洗い流す	10分
②	5%ブドウ糖液 100mL	ダトロウェイ	抗がん剤	90分 ⇒30分
③	5%ブドウ糖液 100mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	30分
合計	350mL	点滴時間 2時間40分⇒1時間40分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

	1日目(点滴当日)	2日目以降
デカドロン (吐き気止め)	なし	 1日2回朝食後 1回1錠 (2日間)

今後の予定

- 点滴は3週間に1回です。
- 症状によって変更することがあります。

ダトロウェイ | ■□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★★		爪の変形	★
数日から数週間	食欲不振	★		におい・味覚の変化	★
	下痢	★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	便秘	★★			
	脱毛	★★			
	白血球減少	★			
好中球減少	★				

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
投与後1週間~2週間：白血球減少および好中球減少
投与後3週間：血小板減少

注意点

- ポララミンの副作用で眠気が出る場合があります。
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 点滴後24時間(特に最初の2時間)は過敏症や悪寒などが起こることがあります。(毎回点滴開始時にカロナールを服用します)
- 間質性肺炎が起こることがあります。息切れ、呼吸がしにくい、空咳、発熱などの症状があらわれた場合は、すぐにお知らせください。
- 角膜障害が起こることがあります。コンタクトレンズの使用は避け、ソフトサンティア等の点眼薬を1日6回程度点眼してください。
目の違和感が出現した場合は、すぐにお知らせください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。