

# 乳腺：トロデルビ day1,8/3wks

## 点滴

	輸液	作用薬	効果	点滴時間
①	(のみ薬)	カロナール錠 2錠	Infusion reaction 予防	
	生理食塩液 50mL	パロノセトロン デキサート ガスター ポララミン	吐き気止め アレルギー予防	30分
①	生理食塩液 50mL		ルートを洗い流す	10分
②	生理食塩液 250mL	トロデルビ	抗がん剤	3時間 ⇒2時間 ⇒1時間
③	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す (炎症を予防)	30分
合計	400mL	点滴時間 4時間 10分⇒3時間 10分⇒2時間 10分		

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

## 今後の予定

- 点滴は1週間に1回で、2週繰りかえし、3週目はお休みします。
- 症状によって変更することがあります。

トロデルビ | ■□□□□□□ | ■□□□□□□ | □□□□□□□ |

## 主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★		爪の変形	★
数日から数週間	食欲不振	★		におい・味覚の変化	★
	下痢	★★		起こりやすさの目安 ★ 30%未満 ★★ 30%~60% ★★★ 60%以上	
	便秘	★★			
	脱毛	★★			
	白血球減少	★★★★			
好中球減少	★★★★				

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。  
投与後 1 週間~2 週間：白血球減少および好中球減少  
投与後 3 週間：血小板減少

## 注意点

- ポララミンの副作用で眠気が出る場合があります。  
(外来で治療を受けるとき、車の運転はお避けください)
- 点滴後 24 時間 (特に最初の 2 時間) は過敏症や悪寒などが起こることがあります。  
(毎回点滴開始時にカロナールを服用します)
- 下痢が続く場合は、脱水状態などを防ぐため、水分補給を行ってください。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。