


乳腺：ddAC/2wks（注射アカリス）

点滴

順序	輸液	作用薬	効果	時間
①	生理食塩液 100mL	アロカリス パノセトロン デキサート	吐き気止め	30分
②	生理食塩液 50mL			5分
③	5%ブドウ糖液 100mL	ドキシソピシン	抗がん剤（赤色）	15分
④	生理食塩液 100mL	エンドキサン	抗がん剤	15分
⑤	生理食塩液 50mL		血管を洗い流す （炎症を予防）	15分
点滴時間 およそ1時間20分				

※ 薬の量はあなたの体格(身長・体重)によって決まります。

のみ薬

	1日目(点滴当日)	2日目～
イリマ [®] ラゾール (消化性潰瘍予防) 	なし	1日1回 朝食後 1回1カプセル

今後の予定

- 点滴は2週間に1回で、4回繰り返します。
- 抗癌剤投与後にジーラスタ皮下注ポディポッドを装着します。

点滴 | ■□□□□□□□ | □□□□□□□□ |

主な副作用

時期	副作用	起こりやすさ	時期	副作用	起こりやすさ
数日	吐き気・嘔吐	★★	数週間以降	貧血	★
	口内炎	★★		しびれ	★
数日から数週間	食欲不振	★★		爪の変形	★★
	下痢	★		色素沈着	★★
	便秘	★★		におい・味覚の変化	★
	脱毛	★★★★		起こりやすさの目安	
	白血球減少	★★★★		★ 30%未満	
	出血	★	★★ 30%～60%		
			★★★ 60%以上		

※ 副作用の出現の時期や程度には個人差があります。
 投与後1週間～2週間：白血球減少および好中球減少
 投与後3週間：血小板減少

注意点

- 口内炎予防のために③の点滴前から氷片を口に含んでください。
- 水分を多めにとり、尿を出してください。
- 点滴後1日くらいは尿が赤くなりますが、心配ありません。
- ごくまれに心臓に負担がかかることがあります。
- 点滴中は点滴が漏れてないか気をつけてください。
- その他、何か変わったことがあったら、すぐにお知らせください。